טיפול עם פלאמינל פורטה ב-3 כיבים סוכרתיים שלא הגיבו לטיפולים אחרים

אלעד קורן, אח,לאומית, ירושלים



היסטוריה רפואית:

מטופל בן 65 עם 3 כיבים סוכרתיים ברגל שמאל. ברקע סוכרת לא מאוזנת במשך 4 שנים ואי ספיקה ורידית.

כמו כן, סוכל מחרדות.

טיפולים קודמים בקהילה כמו טיפולים אנטימיקרוביאלים, רימות, אנטיביוטיקה, הטרייה מכנית ומגוון חבישות לא שיפרו את מצב החולה.

תוכנית ההתערבות הנוכחית הובלה על ידי אח הקהילה וכללה מעקב של צוות מקצועי רב תחומי כולל תזונאית, אחות, מעקב בדיקות דם וגיוס והדרכה של בני המשפחה שמטפלים ומסייעים לחולה בטיפול עצמי בבית כגון, חבישות וטיפולים נוספים.

הטיפול הנבחר בהתערבות זו הוא פלאמינל פורטה על בסיס יומיומי להטרייה, איזון לחות וטיפול בזיהום.


1

באבחון

פצע ראשון (תמונה 1)- קוטר של 7 ס"מ ועומק של 12 מ"מ בגב רגל שמאל, באספקט הדורסלי

- סלאפ צהובה בפצע
- גידים חשופים
- גידים באספקט הדורסלי

פצע שני- בבוהן השלישית

- שחורה
- הפרשה צהובה

פצע שלישי- קוטר 25 מ"מ בבוהן מכוסה סלאפ צהוב

המטופל טופל בפלאמניל במשך 4 חודשים עם הפחתה בכמות המשחה בהתאם לשיפור בפצע (מ-57 גרם ליום בתחילת טיפול הפחית ל-13 גרם יום לאחר 105 ימים).

בפצע השלישי ניכר ה:

הפחתה בהפרשות, התכווצות הפצעים, הופעה של תהליך גרנוליזציה ואפיתליזציה


2

תמונה 2

אחרי 29 חודשים (4.5.17)- הפצע בבוהן הראשונה 1 ס"מ. בשלב זה מקבל חבישת סילקון כל שבוע.

לסיכום:

המקרה הזה מוכיח את היעילות שבטיפול רב תכליתי בעל 3 פעולות בו זמנית- הטרייה, איזון לחות וטיפול אנטימיקרוביאלי.

BR064/01 FEB.20